

**Título do trabalho:**

6

A INFLUÊNCIA DO TESTE RÁPIDO ANTI-HIV SOBRE A LIBERAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Nome do Participante:** Lucia de Fatima Garcia Veloso

**Nome do Autor:** Lucia de Fatima Garcia Veloso

**Co-autores:** Renan Scheidegger Cardoso, Raissa Barros Martins

**Resumo do trabalho:**

**Introdução:** A epidemia de AIDS tem apresentado taxas de incidência crescentes passando a ser problema cada vez mais importante na saúde pública. Considerando que o aleitamento materno representa risco adicional de transmissão do HIV estimado entre 7 e 22%, a partir de 2007, o Ministério da Saúde passou a recomendar o teste anti-HIV no primeiro e terceiro trimestres de gestação, orientando que as mães com diagnóstico HIV positivo deverão ser aconselhadas a não amamentar. Para a gestante que desconhece este resultado, a recomendação de 2009, é que se realize o teste rápido anti-HIV ao chegar à maternidade, mas a demora no resultado deste teste, pode caracterizar um problema para o pediatra assistente em relação à liberação do aleitamento materno. **Objetivos:** estimar as curvas de tempo entre o nascimento e a primeira mamada dos bebês nascidos em um hospital público do Estado do Rio de Janeiro, avaliar o tempo de realização do teste rápido anti-HIV e quantificar a demora na liberação dos resultados do teste rápido nos casos em que este exame foi entregue após o nascimento. **Métodos:** Foi realizado um estudo de coorte prospectivo, entre agosto de 2011 e agosto de 2012, tendo como evento inicial o nascimento e como desfecho, a primeira mamada. As informações foram colhidas através de um questionário semi-estruturado aplicado às 90 puérperas do período selecionado. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. **Resultados:** Os resultados revelaram um tempo médio de 5 horas e 13 minutos entre o nascimento e a primeira mamada ao seio materno, uma média de realização do teste rápido anti-HIV de 1 hora e 19 minutos e uma demora de 4 horas e 46 minutos para a liberação do resultado nos casos em que este resultado foi liberado somente após o nascimento. **Conclusão:** a demora na execução deste exame pode acarretar como um impacto negativo sobre a decisão do pediatra em liberar o aleitamento materno, retardando a primeira mamada.

**Situação do trabalho:** Concluído

**Palavras-chave:** aleitamento materno, amamentação, sorodiagnóstico da AIDS